

Число больных, имеющих минимальную болезненность при максимальных пассивных движениях в суставах, – 10 (23,2%) уменьшилось после вакцинации до 6 (13,9%) ($p > 0,05$), что обусловило уменьшение количества болезненных суставов в общем с 27 до 14 ($p > 0,05$). Аналогичным образом уменьшилось и число пациентов, имеющих ограничение подвижности суставов, а также число суставов с ограничением подвижности вследствие воспалительных и соединительнотканых контрактур ($p > 0,05$) [7, 30].

Таким образом, отрицательного влияния на суставной синдром у пациентов с хроническими заболеваниями суставов с минимальной активностью заболевания не было выявлено ни при моновакцинации против пневмококковой инфекции, ни в случае сочетания вакцины с другими препаратами. Колебания ряда оцениваемых показателей могут быть связаны с сезонными обострениями или коррекцией терапии [7, 30].

Продолжение в следующем номере.

Список литературы можно получить в редакции

ИНФОРМАЦИЯ ВОЗ

Охват профилактическими прививками в мире в 2014 году

В ноябрьском за 2015 год номере еженедельного эпидемиологического отчета ВОЗ опубликованы данные об охвате профилактическими прививками населения стран – членов ВОЗ. В рамках национального календаря профилактических прививок вакцинация осуществлялась: вакциной БЦЖ – в 160 странах, вакциной против гепатита В – в 184 странах (в 96 странах первую прививку проводят в родильном доме), вакциной против краснухи – в 140 странах, вакциной против гемофильной инфекции типа b – в 192 странах, ротавирусной вакциной – в 74 странах, конъюгированной пневмококковой вакциной – в 117 странах, АКДС и коревой вакцинами – все страны члены ВОЗ (вторую прививку против кори, ревакцинацию АКДС и полиомиелитной вакцинами осуществляют 154 страны).

В этом же номере приведены материалы о прогрессе, достигнутом в 2000 – 2014 годах при выполнении региональных программ элиминации кори. За этот период количество стран, осуществивших вакцинацию 90% детей и более, выросло с 84 (44 %) до 131 (68 %). Из 20,6 млн детей, не привитых в 2014 году, 56% пришлось на 6 стран: Индия (4,2 млн), Нигерия (3,3 млн), Пакистан (1,6 млн), Индонезия (1 млн), Эфиопия (0,9 млн), Демократическая Республика Конго (0,6 млн).

К 2014 году число стран, осуществляющих двукратную вакцинацию, увеличилось с 97 (51%) до 154 (79%), при этом число детей, получивших вторую прививку, выросло с 15 до 56%. За 2000 – 2014 годы число ежегодно регистрируемых случаев кори сократилось на 69% (с 146 до 40 случаев на миллион). В течение 2000 – 2014 годов Американский регион поддерживал заболеваемость на уровне менее 5 случаев на 1 млн. В африканском регионе она уменьшилась на 57%, несмотря на вспышки, происходящие в Эфиопии и Анголе. Снижение заболеваемости корью произошло также и в странах Европейского и Юговосточно-азиатского региона, хотя в некоторых странах в 2014 году были зарегистрированы вспышки заболевания (в Сомали – 10 278 слу-

чаев, в Российской Федерации – 4 711, в Индии – 24 977 случаев). Увеличение заболеваемости в 2014 году произошло и в ряде стран Американского региона (США – 677 случаев, Бразилия – 727 случаев) и в странах западной части Тихого океана (Филиппины – 58 848 случаев, Китай – 52 628, Вьетнам – 15 033 случая).

В течение указанного периода число летальных исходов кори сократилось на 79% (с 546 800 до 114 900). Таким образом, за 2000 – 2013 годы вакцинация сохранила жизнь 17,1 млн человек.

Американский региональный комитет по верификации элиминации кори определил, что весь регион может быть декларирован свободным от кори после того, как Бразилия подтвердит отсутствие эндемических случаев инфекции в течение по крайней мере одного года.

Тихоокеанский региональный комитет по верификации элиминации кори подтвердил отсутствие эпидемических случаев кори в двух странах и на одной территории, тем самым количество стран свободных от кори достигло семи.

Европейский региональный комитет по верификации элиминации кори подтвердил элиминацию кори в 22 странах.

По оценкам, в 2014 году в мире 18,7 миллиона детей грудного возраста не были привиты против дифтерии, столбняка и полиомиелита. Более 60% этих детей живут в 10 странах: Демократической Республике Конго, Индии, Индонезии, Ираке, Нигерии, Пакистане, Уганде, Филиппинах, Эфиопии и Южной Африке.

Перечень документов, определяющих позицию ВОЗ в отношении вакцин (WHO position papers) и их электронные адреса представлены на сайте <http://www.who.int/immunization/documents/positionpapers/en/>

Подготовил А.Н. Озерецковский
Источник: Global Routine vaccination Coverage
2014. Weekly epidemiological record.
2015; 90: 617– 623