

0,6 – 1,1 на 100 тыс. лиц до 20 лет, у детей 5 – 9 лет – 1,2 – 1,8 на 100 тыс. контингента. С 2010 по 2013 год было зарегистрировано всего 9 случаев ювенильного РРП. Четырехвалентная вакцина практически в 100% эффективна против ВПЧ 16 и ВПЧ 18 типов ассоциированных CIN 2/3, на 99% против кондиллом ВПЧ 6 и ВПЧ 11 типов у женщин и на 90% у мужчин. Инфицированность ВПЧ 6, 11, 16, 18 типов девочек 14 – 19 лет при реализации программы уменьшилась на 56% в 2006-2012гг. В Австралии при 70% охвате прививками на 75% снизилось число CIN.

Вакцинация женщин уже леченных от ВПЧ инфекции достоверно снизила риск повторной патологии.

Популяционный эффект продемонстрирован снижением числа случаев ВПЧ-инфекции 16 и 18 типов и аногенитальных кондиллом как в группах привитых, так и женщин и мужчин старшего возраста. Показана перекрёстная защита от ВПЧ 31, 33, 45 типов. С 2004 по 2015 год в Австралии резко сократилась частота выявления типов ВПЧ, связанных с раком, у молодых мужчин.

По наблюдению в 20 странах ВПЧ-вакцины показали безопасность и эффективность. Предотвращенные затраты при использовании

четырёхвалентной вакцины практически в 2 раза выше, чем при использовании двухвалентной (во многом за счёт снижения затрат на аногенитальные бородавки). Четырёхвалентная вакцина показана для профилактики ВПЧ-ассоциированных поражений, включая рак разных локализаций, а также аногенитальных кондиллом у мужчин в возрасте от 9 до 26 лет. Результаты массовых программ вакцинации против ВПЧ при условии высокого охвата доказали свою эффективность в реальной практике как среди женщин, так и среди мужчин.

Заключение

Несмотря на то, что Национальный календарь профилактических прививок РФ расширился, он по-прежнему не включает в себя вакцинацию против ВПЧ-инфекции. Не представлена папилломавирусная инфекция и в Календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

По итогам заседания было принято решение изложить в Резолюции конгресса предложение для Министерства здравоохранения РФ о внесении вакцинации против папилломавирусной инфекции в Национальный календарь профилактических прививок.

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

О проведении Европейской недели иммунизации в Российской Федерации в 2017 году

Иммунизация всемирно признана одной из самых успешных и эффективных мер здравоохранения по сохранению жизни и здоровья людей. Россия в составе Европейского региона с 2002 года поддерживает статус страны, свободной от полиомиелита и вместе с мировым сообществом поставила цель в ближайшие годы достичь Глобальной ликвидации полиомиелита.

На низких уровнях регистрируется заболеваемость дифтерией, столбняком, краснухой, эпидемическим паротитом, стабилизирована эпидситуация по кори.

Благодаря массовой иммунизации против гепатита В, число детей, заболевших острым гепатитом В, сегодня исчисляется единицами (за 2016 г. – 22 ребенка до 17 лет).

Массовая иммунизация населения против гриппа, в том числе детей (в 2016 г. привито более 56,4 млн человек, из них свыше 15 млн детей), позволяет ежегодно существенно снижать интенсивность эпидемического процесса гриппа и бремя его социально-экономических последствий.

Цель настоящей кампании – увеличение охвата вакцинацией посредством привлечения внимания и повышения осведомленности о важности иммунизации, в частности среди уязвимых групп населения.

В организации и проведении ЕНИ-17 примут участие представители органов и учреждений Ро-

спотребнадзора, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, городов и муниципальных образований, органов исполнительной власти управлений здравоохранением, образования, социальной защиты населения, опеки и попечительства, организаций науки и культуры, представители медицинских организаций, детских дошкольных и образовательных учреждений, средств массовой информации.

К этой работе привлекаются также неправительственные организации (профсоюзы работников здравоохранения и др.), средства массовой информации, медицинские организации, руководители предприятий, религиозные лидеры.

В ходе ЕНИ-2017 особое внимание будет уделено работе с родителями, отказывающимися от иммунизации детей, труднодоступными группами населения (цыгане, религиозные группы населения, социально-неблагополучные лица, проживающие в труднодоступных для иммунизации территориях, кочующее население, мигранты и т.п.), что позволит укрепить общую приверженность населения вакцинапрофилактике и защитить большее количество детей и взрослых от инфекций, управляемых средствами специфической профилактики.

Источник: http://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=8183