

Резолюция первой Российской конференции с международным участием «Злокачественные опухоли, ассоциированные с ВПЧ. Первичная профилактика и скрининг» 18 мая 2019 г. Москва

The First Russian Conference with International Participation «Malignant Tumors Associated with HPV. Primary Prevention and Screening»

Конференция была организована ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России и Противораковым обществом России в сотрудничестве с Международным агентством по изучению рака (ВОЗ), Национальным институтом рака США и Международным обществом онкогинекологов (США) при финансовой поддержке Российского Фонда фундаментальных исследований.

Председатели конференции: директор НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России член-корр. РАН профессор И. С. Стилиди, президент Противоракового общества России член-корр. РАН профессор Д. Г. Заридзе, директор Международного агентства по изучению рака (МАИР) д-р Е. Вайдерпасс, директор Центра глобального сотрудничества Национального института рака США д-р Э. Тримбл.

В работе конференции приняли участие замминистра здравоохранения Российской Федерации О. О. Салагай, зампредседателя Совета Российского фонда фундаментальных исследований член-корр. РАН В. В. Квардаков, представитель ВОЗ в Российской Федерации М. Вуйнович; ведущие российские ученые: академики РАН Н. И. Брико, А. Д. Каприн, В. И. Краснопольский, В. Г. Поляков, член-корр. РАН В. Б. Матвеев, И. Т. Хатьков, а также более 450 российских онкологов, гинекологов, венеро-дерматологов, педиатров, врачей общей практики, организаторы здравоохранения из России, Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана. Заслушав доклады и выступления в прениях, участники конференции констатировали:

В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2008 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2014 года» (национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография») были сформулированы следующие приоритетные цели: повысить ожидаемую продолжительность жизни при рождении до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет), увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни до 67 лет, снизить показатель смертности населения от новообразований, в том числе злокачественных. При этом особое значение

придается профилактике, как наиболее эффективному и экономически обоснованному средству борьбы с раком.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) является причиной развития целого ряда онкологических заболеваний у женщин и мужчин. Согласно представленной на конференции информации, 12 типов вируса папилломы человека признаны канцерогенными для человека и приводят к развитию рака шейки матки (РШМ), вульвы, влагалища, анального канала, ротоглотки, полового члена и неонкологического инфекционного заболевания – аногенитальных кондилом.

На конференции была рассмотрена доказательная база канцерогенности ВПЧ и эффективности вакцинации против этого вируса. Были обсуждены молекулярные механизмы ВПЧ канцерогенеза, проведен анализ эпидемиологических исследований, посвященных доказательству канцерогенности ВПЧ для человека; представлены результаты клинических рандомизированных исследований эффективности вакцин против ВПЧ и результаты наблюдения за вакцинированными женщинами в странах, в которых вакцинация началась в 2007–2008 гг. Были заслушаны доклады об эффективности ВПЧ-тестирования для скрининга и ранней диагностики рака шейки матки. Приведенные экспертами статистические данные о заболеваемости и смертности от рака шейки матки и других заболеваний, ассоциированных с вирусами папилломы человека, свидетельствуют о высоком социально-экономическом и демографическом бремени данных заболеваний.

Заболеваемость злокачественными опухолями, причиной которых является инфекция канцерогенными типами вируса папилломы человека, растет. В частности стандартизованный показатель заболеваемости (СПЗ) раком шейки матки вырос с 10 в 1990 г. до 16 на 100 тыс. женского населения в 2018 г. Прогнозируется дальнейший рост этого показателя до 20 в 2030 г., т.е. по сравнению с 1990 г. СПЗ вырастет в 2 раза.

Наиболее выраженный рост показателя по возрастной заболеваемости (ППЗ) зарегистрирован

у женщин 30–39 и 40–49 лет. Прогнозируется, что у женщин в возрасте 30–39 заболеваемость раком шейки матки вырастет более, чем в 3 раза, с 10 в 1990 г. до 35 на 100 тыс. женского населения в 2030 г., а у женщин в возрасте 40–49 с 20 до 69, т.е. в 3,5 раза. Вырастет почти вдвое и грубый показатель заболеваемости раком шейки матки у женщин всех возрастов с 15 в 1990 г. до 28 на 100 тыс. женского населения в 2030 г.

Растет и смертность от рака шейки матки у молодых женщин. В 2016 г. у женщин в возрасте 25–39 лет показатель смертности был в 2,5 раза выше, чем в 1990 г. (2,1–5,0), в возрастной группе 40–49 лет в 1,8 раза (7,2–12,7) и, наконец, в возрастной группе 50–54 года в 1,5 раза выше (9,3–13,7). Кроме того, отмечается выраженный рост заболеваемости другими формами злокачественных опухолей, ассоциированных с вирусами папилломы человека, а именно рака вульвы, влагалища, орофарингеального рака и полового члена.

Вакцинация против ВПЧ является единственной эффективной и безопасной мерой борьбы с этими болезнями. Всемирная организация здравоохранения отмечает важность вакцинации против ВПЧ и рекомендует ее приоритетное включение в национальные календари прививок. Вакцинация против ВПЧ представлена в национальных программах прививок в 92 странах, в 20 из них реализуется стратегия гендерно-нейтральной вакцинации.

Несмотря на положительный опыт вакцинации против вируса папилломы человека в ряде регионов России с 2008 г., в частности в Московской области, а также в Москве с 2019 г., до сих пор в России не организована массовая вакцинопрофилактика на уровне Национального календаря профилактических прививок.

Прогноз заболеваемости и смертности от рака шейки матки в мире указывает на то, что ВПЧ вакцинация приведет к значительному снижению заболеваемости и смертности от рака шейки матки. На основании

изучения прогноза заболеваемости и смертности от рака шейки матки в России можно сделать вывод, что если мы немедленно не начнем вакцинировать подростков соответственно рекомендациям ВОЗ и МАИР, то заболеваемость РШМ в России будет расти и достигнет к 2030 г. 28 на 100 тыс. женского населения. В то же время, в Австралии, где уже с 2007 г. начали вакцинировать девочек, а с 2011 г. мальчиков, к 2030 г. прогнозируют снижение заболеваемости РШМ до 4 на 100 тыс. женского населения.

На основании научных данных, представленных на конференции, можно заключить, что эффективность вакцинопрофилактики рака шейки матки доказана на самом высоком уровне достоверности. В связи с этим становится очевидной необходимость как можно более оперативного решения вопроса организации массовой вакцинации подростков обоих полов в возрасте 11–14 лет против вируса папилломы человека. Подобная мера позволит значительно снизить заболеваемость и смертность от рака шейки матки и других онкологических заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы человека, а также неонкологических заболеваний, вызываемых вирусом. Кроме того, внедрение вакцинации против ВПЧ в Национальную программу иммунизации позволит повысить показатели ожидаемой продолжительности жизни при рождении и продолжительности здоровой жизни, а также приведет к значительной экономии средств, выделяемых на лечение рака шейки матки и других заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы человека.

Расчеты международных экспертов-экономистов, сделанные в разных странах, доказывают, что вакцинация против ВПЧ экономически выгодна для национального здравоохранения. Так что аргументы об отсутствии средств в национальном бюджете для включения вакцинации против ВПЧ в Национальный календарь профилактических прививок не состоятельны.